marimer

Marimer Inhalații

MARIMER Inhalații este o soluție sterilă de apă de mare hipertonică. Formula sa naturală este recomandată sugarilor începând cu vârsta de 1 an, copiilor și adulților pentru hidratarea și calmarea căilor respiratorii în caz de congestie, simptome obstructive, respirație șuierătoare sau tuse cronică. Acțiunea osmotică a **MARIMER Inhalații** ajută la fluidizarea și eliminarea excesului de mucus, favorizând eliminarea secrețiilor din căile respiratorii. **MARIMER Inhalații** ajută la restabilirea confortului respirator și la îmbunătățirea calității vieții. Soluția **MARIMER Inhalații** poate fi utilizată în ședințe de inhalații sau de terapie cu aerosoli.

COMPOZIȚIE

Apă de mare, apă purificată (echivalentul a 22 g/L de săruri). Fără conservanți.

PREZENTARE

Cutie cu 30 unidoze de 5 ml.

INDICAȚI

MARIMER Inhalații este destinat sugarilor începând cu vârsta de 1 an, copiilor și adulților în ședințe de inhalații sau de terapie cu aerosoli, pentru îmbunătățirea funcției respiratorii (dificultăți de respirație), în special la pacienții care suferă de fibroză chistică, bronșiolită acută sau boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).

POSOLOGIE

O unidoză de 5 ml este indicată pentru fiecare sesiune de terapie cu aerosoli sau inhalații. Utilizați 1 unidoză de 2-4 ori pe zi în funcție de intensitatea simptomelor și de indicațiile medicului dumneavoastră.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Detașați o unidoză și deschideți- o prin rotirea părții superioare.
- Turnați soluția pentru inhalații în nebulizator. Această soluție poate fi utilizată cu nebulizatoare. Urmați instrucțiunile de utilizare ale producătorului nebulizatorului.

EFECTE NEDORITE

În cazuri rare, pot apărea bronhospasme și tuse accentuată. Se poate recomanda tratamentul prealabil cu bronhodilatatoare.

BIESSEN Pharma

marimer

CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza la sugari cu vârsta sub 1 an. A nu se utiliza la sugari cu atelectazie. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate la apa de mare.

ATENȚIONĂRI

NU INJECTAȚI. NU ÎNGHIȚIȚI. UTILIZARE UNICĂ. A nu se amesteca cu alte medicamente. Nu utilizați o unidoză deja deschisă sau deteriorată, din cauza riscului de contaminare bacteriană rapidă. Dacă simptomele persistă sau se agravează, consultați medicul. Raportați orice incident grav apărut în legătură cu acest dispozitiv la Laboratoires Gilbert website: www.labogilbert.fr și/sau la autoritatea națională competentă.

A NU SE LĂSA LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR.

CONDIȚII DE PĂSTRARE:

Nu depășiți data de expirare indicată pe unidoză. A se feri de lumină.

BIESSEN Pharma